



ข่าวเตือนการระบาดของศัตรูพืชประจำสัปดาห์

กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย กรมส่งเสริมการเกษตร

ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๑๖ ประจำวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘

โรคราแป้งเงาะ (ภาคตะวันออก)

เดือนเกษตรกรชาวสวนเงาะในภาคตะวันออก : ในช่วงนี้เงาะส่วนใหญ่อยู่ในระยะออกดอก ติดผลอ่อน และบางส่วนเริ่มให้ผลผลิต ซึ่งมีขนาดแตกต่างกันเนื่องจากการออกดอกไม่พร้อมกัน โรคที่จะเข้าทำลาย ในระยะนี้คือ โรคราแป้ง อาการรุนแรงจะเกิดที่ดอกและ ผลอ่อนขนาดเท่าหัวไม้ขีด จะมีผงสีขาว ๆ คล้ายแป้ง เกาะอยู่ทำให้ดอกและผลอ่อนร่วง หรือถ้าไม่ร่วงก็สามารถเจริญเติบโตได้ แต่เชื้อราจะเข้าทำลายตามซอกขน ปลายขนทำให้เงาะขนกุด ขนเกรียน ผิวกร้าน นอกจากนั้นแล้วเชื้อรายังเข้าทำลายใบอ่อนที่อยู่ตามกิ่ง ในทรงพุ่ม

สาเหตุ

เกิดจากเชื้อรา *Pseudoidium nephelii*

กรมส่งเสริมการเกษตรแนะนำวิธีการป้องกันและกำจัด ดังนี้

๑. ถ้าพบเชื้อราระบาดไม่มากนักควรเก็บผลหรือส่วนที่เป็นโรค ทั้งที่อยู่บนต้นและที่ร่วงหล่นมาเผาทำลาย เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ
๒. ทำการสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ ถ้าพบระบาดรุนแรง ควรตัดสินใจใช้สารเคมีพ่นกำจัด ดังนี้
 - กำมะถันผงละลายน้ำ อัตรา ๔๐ มิลลิลิตร ต่อน้ำ ๒๐ ลิตร ฉีดพ่นในช่วงเช้าหรือเย็น ห้าม ฉีดพ่นในขณะที่อากาศร้อนเพราะจะทำให้ขนอ่อนของเงาะไหม้ได้
 - คาร์เบนดาซิม ๕๐ % ดับบลิวพี อัตรา ๖ - ๑๒ กรัม ต่อน้ำ ๒๐ ลิตร
 - ไดโนแคพ ๒๕ % ดับบลิวพี อัตรา ๑๐ - ๒๐ กรัม ต่อน้ำ ๒๐ ลิตร

*** ทั้งนี้ในการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช เกษตรกรควรใช้ด้วยความระมัดระวังและคำนึงถึงความปลอดภัยต่อตัวผู้ใช้และผลผลิตที่ปลอดภัยจากสารพิษ

