

หนอนกระทู้ผัก

พืชอาหาร

พืชผัก ไม้ผล พืชไร่และไม้ดอก เช่น ผักตระกูลกะหล่ำ พริก มะเขือเทศ หน่อไม้ฝรั่ง กระเจี๊ยบเขียว กัลฉวย ส้ม แตงโม องุ่น งา อ้อย ละหุ่ง ผ้าย ยาสูบ ทานตะวัน บัว กุหลาบ กัลฉวยไม้ ดาวเรือง ฯลฯ



ไข่



หนอน

ระยะพืชที่ถูกทำลาย ทุกระยะ

ลักษณะการทำลาย

ผีเสื้อวางไข่เป็นกลุ่ม ปกคลุมด้วยขนสีฟางขาว เมื่อหนอนฟักเป็นตัว จะแทะกินผิวใบ จนเหลือแต่เยื่อผิวใบขาวๆ และใบเป็นรูพรุน หนอนโตกัดกินใบทั้งใบ นอกจากนี้ยังทำลาย ดอก ฝัก และผล



การป้องกันและกำจัด

1. เก็บกลุ่มไข่และหนอนทำลาย
2. พ่นเชื้อบีที ตามคำแนะนำในฉลาก
3. พ่นสารสะเดา อัตราเมล็ดสะเดาบด 1 กิโลกรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร หมักทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง กรองเอากากออก นำน้ำสะเดาพ่นแมลง หรือใช้สารสกัดสะเดาน้ำตามคำแนะนำในฉลาก
4. พ่นสารเคมี เช่น สปีนโนแซด ฟิโปรนิล แลมป์ดาไซฮาโลทริน ฯลฯ ตามคำแนะนำในฉลาก

