



หนอนใยผัก

พืชอาหาร

ตระกูลกะหล่ำ เช่น คะน้า กวางตุ้ง ผักกาดขาว กะหล่ำปลี ฯลฯ



หนอน

ระยะพืชที่ถูกทำลาย

ทุกระยะ

ลักษณะการทำลาย

ตัวหนอนกัดกินใบจนเป็นรูพรุน



ตัวเต็มวัย



การป้องกันและกำจัด

1. ใช้กับดักกาวเหนียวสีเหลือง อัตรา 80 กับดักต่อไร่
2. พ่นเชื้อบีที อัตราตามฉลาก
3. พ่นสารเคมี เช่น สปีนโนแซด แลมป์ดาไซฮาโลทริน พิโปรนิล อัตราตามฉลาก หนอนใยผักเป็นแมลงที่สร้างความต้านทานต่อสารเคมีได้อย่างรวดเร็วจึงจำเป็นต้องระมัดระวังในการใช้สารเคมีกำจัด เช่น ไม่ใช้สารเคมีชนิดเดียวกันติดต่อกัน เกิน 3 ครั้งต่อฤดูปลูก หรือใช้สารเคมีต่างชนิดสลับกัน หรือใช้สารเคมีสลับกับพ่นเชื้อบีที

