

# หนอนห่อใบข้าว

## ระยะพืชที่ถูกทำลาย

ระยะแตกกอ

## ลักษณะการทำลาย

ผีเสื้อวางไข่ที่ใบข้าว เมื่อหนอนฟักจะแทะผิวใบ เห็นเป็นแถบยาว สีขาว หนอนใช้ใยดึงขอบใบข้าว ทั้งสองด้านห่อหุ้มตัว มักพบการทำลายในสภาพนาข้าวที่อยู่ในที่ร่ม หรือข้าวที่ใบหนาแน่นมาก



## การป้องกันและกำจัด

1. กำจัดพืชอาศัย เช่น หญ้าข้าวหนก หญ้าปล้อง หญ้าชันอากาศ และข้าวป่า
2. เมื่อมีการระบาดไม่ควรใช้ปุ๋ยยูเรียเกิน 10 กิโลกรัมต่อไร่
3. พ่นเชื้อราบิวเวอเรีย เพื่อกำจัดหนอน อัตรา 1 กิโลกรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นในช่วงเย็น
4. พ่นสารฟิโปรนิล เบนซัลเทป ตามคำแนะนำในฉลาก ไม่ควรใช้สารเคมีชนิดเม็ด และสารกลุ่มไพรีทรอยด์สังเคราะห์ ในข้าวอายุหลังหวาน 40 วัน เพราะจะทำลายศัตรูธรรมชาติ ทำให้เกิดการระบาดรุนแรงในระยะข้าวตั้งท้อง-ออกรวง

