



หนอนเจาะสมอฝ้าย

พืชอาหาร

พืชผัก ไม้ผล พืชไร่ และไม้ดอก เช่น พริก มะเขือ หน่อไม้ฝรั่ง มะเขือเทศ กระเจี๊ยบเขียว แตงโม องุ่น ส้ม ละหุ่ง ฝ้าย ทานตะวัน กุหลาบ สร้อยทอง ฯลฯ



ระยะพืชที่ถูกทำลาย ทุกระยะ

ลักษณะการทำลาย

หนอนกัดกินส่วนต่างๆ มักทำลายดอกและผลมากกว่าใบ โดยหนอนเจาะกินผล พริก มะเขือ มะเขือเทศ สำหรับในแตงจะกัดกินเกสรของดอกแตงมากกว่าส่วนอื่นๆ ทำให้ดอกร่วง ไม่ติดผล ส่วนในกุหลาบหนอนทำลายใบและดอก



ภาพโดยกรมวิชาการเกษตร



การป้องกันและกำจัด

1. พ่นเชื้อบีที โดยเฉพาะในระยะใกล้เก็บเกี่ยว
2. พ่นสารเคมี เช่น แลมป์ดาไซฮาโลทริน เดลทาเมทริน ไซฟลูทริน ไซเพอร์เมทริน/ไพซาโลน สปีนโนแซด คลอร์ฟลูอาซุรอน ตามคำแนะนำในฉลาก

