



# ด้วงหมัดผัก

**พืชอาหาร** พืชตระกูลกะหล่ำ

**ระยะพืชที่ถูกทำลาย** ทุกระยะ

## ลักษณะการทำลาย

ตัวอ่อนของด้วงหมัดผักชอบกัดกินหรือซ่อนไชเข้าไปกินอยู่บริเวณโคนต้น หรือรากของผัก ทำให้พืชผักเหี่ยวเฉาและไม่เจริญเติบโต ถ้ารากถูกทำลายมากๆ ก็อาจทำให้พืชผักตายได้ ตัวเต็มวัยชอบกัดกินด้านล่างของผิวใบ ทำให้ใบมีรูพรุน และอาจกัดกินลำต้นและกลีบดอกด้วย ด้วงหมัดผักชอบอยู่รวมกันเป็นกลุ่มๆ ตัวเต็มวัยเมื่อถูกกระทบกระเทือนชอบกระโดดและสามารถบินได้ไกลๆ ด้วงหมัดผักชอบทำลายผักในตระกูลกะหล่ำ



## การป้องกันและกำจัด

1. ควรไถตากดินไว้เป็นเวลานานพอสมควร เพื่อทำลายตัวอ่อนและดักแด้ที่อยู่ใต้ดิน นอกจากนี้ควรเปลี่ยนมาปลูกพืชที่ด้วงหมัดผักไม่ชอบ ก็จะเป็นการช่วยลดการระบาดได้อีกทางหนึ่ง

2. สารเคมีกำจัดแมลงกลุ่ม คาร์บาเมต เช่น คาร์บาริล คาร์โบซัลแฟน (อัตราใช้ตามฉลากแนะนำ) ยังคงใช้ได้ผลดีในแหล่งปลูกผักใหม่ๆ ที่ไม่มีการระบาดรุนแรง

ส่วนในแหล่งที่ปลูกผักเป็นประจำควรใช้สารฆ่าแมลงไพรีไธฟอส ไพโรไทโอฟอส ฟิโปรนิล (อัตราตามฉลากแนะนำ) จะให้ผลดีกว่า

3. การใช้ไส้เดือนฝอย อัตรา 4 ล้านตัวต่อพื้นที่ 20 ตารางเมตร ต่อ น้ำ 20 ลิตร โดยพ่นหรือราดไส้เดือนฝอยบนแปลงปลูกผักเมื่อผักอายุได้ 15, 30, และ 45 วัน หลังหว่านเมล็ด

4. ใช้เชื้อบีที ชนิดกำจัดหนอนด้วง พ่นหรือราด 3 ครั้ง ห่างกันครั้งละ 7 วัน



กรมส่งเสริมการเกษตร