

หนอนด้วงหนวดยาว

เจาะลำต้น



ไข่



หนอน



ด้กัด้



ตัวเต็มวัย

หนอนด้วงหนวดยาวเจาะลำต้นทุเรียน



หนอนด้วงหนวดยาว
เจาะลำต้นมะม่วง



ไข่



หนอน



ตัวเต็มวัย

หนอนด้วงหนวดยาวเจาะลำต้นประดู่กิ่งอ่อน

พืชอาหาร ทุเรียน มะม่วง ประดู่กิ่งอ่อน อ้อย

ระยะที่ถูกทำลาย ทุกระยะ

ลักษณะการทำลาย

ตัวเมียวางไข่ในเวลากลางคืนตามลำต้น และกิ่งขนาดใหญ่ตัวหนอนจะกัดกินชอนไชไปตามเปลือกไม้ด้านใน หรืออาจกัดควั่นเปลือกรอบต้น ทำให้ท่อน้ำท่ออาหารถูกตัดทำลาย เป็นเหตุให้ต้นทรุดโทรม ใบร่วง และยืนต้นตายได้



ลักษณะการทำลาย

การป้องกันกำจัด

1. ใช้มิดปลายแหลมชะหาตัวหนอนมาทำลาย
2. ใช้ตาข่ายพันรอบต้นดักตัวเต็มวัย
3. ใช้สารเคมี เช่น

- ไทอะมีโทแซม/แลมป์ดาไซฮาโลทริน 14.1%/10.6% ZC อัตรา 40 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร

- คลอไทอะนิติน 16% SG อัตรา 20 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร

- อิมิดาโคลพริด 10% SL อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร

- อะเซททามิพริด 20% SP อัตรา 30 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร

พ่นให้ชุ่มเฉพาะบริเวณลำต้นตั้งแต่โคนต้นจนถึงยอด และกิ่งขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ด้วงชอบวางไข่ พ่น 2 ครั้ง ห่างกัน 2 สัปดาห์

