

แมลงดำหนาม

พืชอาหาร มะพร้าว ปาล์มประดับ

ระยะพืชที่ถูกทำลาย ใบอ่อนที่ยังไม่คลี่



หนอนแมลงดำหนาม



ตัวเต็มวัยกัดกินยอดอ่อนมะพร้าว

ลักษณะการทำลาย

หนอนและตัวเต็มวัยแมลงดำหนามกัดกินยอดอ่อนมะพร้าวที่ใบยังไม่คลี่ ทำให้ยอดเหี่ยวแห้ง



ลักษณะการทำลาย



การทำลายรุนแรง

การป้องกันและกำจัด

1. ปลอ่ยแตนเบียนอะซีโคเดส
อัตรา 5 มั้มี่ ต่อไร่
ต่อเนื่อง 3 ครั้ง ห่างกัน
2 สัปดาห์ต่อครั้ง



แตนเบียนอะซีโคเดส

2. ปลอ่ยแมลงหางหนีบ ทำลาย
หนอนแมลงดำหนามมะพร้าว
อัตรา 200 ตัวต่อไร่



แมลงหางหนีบ

3. ฟ่นเชื้อราเมตาไรเซียม
อัตรา 1-2 กิโลกรัม
ผสมน้ำ 20 ลิตร



แมลงดำหนามถูกเชื้อราเมตาไรเซียมทำลาย

