

# หอยเชอริ



**พืชอาหาร** ข้าว พืชน้ำต่าง ๆ เช่น สาหร่ายหางกระรอก บัว ฯลฯ

**ระยะพืชที่ถูกทำลาย** ระยะกล้าจนถึงแตกกอ

หอยเชอริมีลักษณะเหมือนหอยโข่งบ้านเรา ในประเทศไทยมีอยู่ 2 ชนิด คือชนิดที่มีเปลือกสีเหลืองปนน้ำตาล และชนิดที่มีเปลือกสีเขียวเข้มปนดำ วางไข่ประมาณครั้งละ 400-2,000 ฟอง โดยปกติจะวางไข่ตามต้นวัชพืช ต้นข้าว กิ่งไม้ หรือตามพื้นดินเหนื่อระดับน้ำ



ไข่



ตัวเต็มวัย

## ลักษณะการทำลาย

หอยเชอริ กินพืชน้ำที่มีลักษณะอ่อนนุ่มได้เกือบทุกชนิด เช่น สาหร่าย ผักบุ้ง ผักกระเฉด ต้นกล้าข้าว และซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยในน้ำ โดยเฉลี่ยวันละประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ ของน้ำหนักตัวหอย โดยเฉพาะต้นข้าว หอยเชอริจะกินต้นข้าวตั้งแต่วัยกล้าอายุประมาณ 10 วัน จนถึงระยะข้าวแตกกอ โดยกัดส่วนโคนต้นข้าว เหนือพื้นดินประมาณ 1.0-1.5 นิ้ว หลังจากนั้นจะกินส่วนใบที่ลอยน้ำจนหมด



ลักษณะการทำลาย

## การป้องกันและกำจัด

### 1. วิธีกล

- 1.1 เก็บกลุ่มไข่และตัวหอยมาสับ ต้มให้สุก ใช้เป็นอาหารสัตว์เลี้ยง เช่น เป็ด ไก่
- 1.2 ใช้ตาข่ายไนล่อนชนิดตาถี่ ดักจับหอยเชอริ ขณะสูบน้ำเข้านา
- 1.3 เมื่อเตรียมเทือกเพื่อหว่านหรือเมื่อปักดำเสร็จแล้ว ควรทิ้งไว้ 2-3 วัน ให้มีน้ำขังอยู่ในระดับ 5-10 เซนติเมตร และหาที่กำบังร่ม ใช้ใบหญ้าอ่อนล่อให้หอยเชอริมากิน แล้วคอยเก็บหอยที่มากินหรือหลบแดดทำลายให้หมด

### 2. วิธีชีววิธี โดยการอนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติ เช่น ตัวห้ำ

### 3. วิธีการใช้สารเคมี เช่น สารคอปเปอร์ซัลเฟต นิโคซาไมด์



ใช้เป็นอาหารสัตว์

