

การควบคุม เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล



เชื้อราบิวเวอเรีย



เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
ถูกเชื้อราบิวเวอเรียทำลาย

5. การใช้เชื้อราบิวเวอเรีย

ใช้เมื่อเริ่มพบการทำลายยังไม่ระบาดรุนแรง โดยพ่นให้สัมผัสกับตัวแมลงและควรพ่นในเวลาเย็นหรือแสงแดดอ่อนๆ

เชื้อราบิวเวอเรีย เป็นจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ ทำลายแมลงศัตรูพืชได้หลายชนิด เมื่อพ่นเชื้อราบิวเวอเรีย ถูกตัวเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ภายใน 1 - 2 วัน จะทำให้เคลื่อนไหวช้าลง ดูดกินอาหารน้อยลงและจะตายภายใน 7 วัน หากความชื้นสูงจะมีเส้นใยสีขาวคลุมทั่วทั้งตัวเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล

วิธีการใช้เชื้อราบิวเวอเรีย



1. อัตราการใช้ ก้อนเชื้อ 1 กิโลกรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร



2. นำก้อนเชื้อมาขยี้ในน้ำ



3. กรองด้วยตาข่ายหรือผ้าขาวบาง



4. ผสมสารจับใบ นำไปพ่นช่วงเวลาเย็น

