

หนอนห่อใบข้าว

พืชอาหาร ข้าว ข้าวป่า ข้าวโพด ข้าวฟ่าง อ้อย หญ้าข้าวนก
หญ้าคา หญ้าชันกาด หญ้าไซ หญ้าตีนกา หญ้าตีนนก หญ้าปล้องหิน หญ้าตีนติด

ระยะพืชที่ถูกทำลาย ทุกระยะ

ลักษณะการทำลาย

ผีเสื้อวางไข่ที่ใบข้าว เมื่อหนอนฟักจะแทะผิวใบ
เห็นเป็นแถบยาวสีขาว หนอนใช้ใยดึงขอบใบข้าว
ทั้งสองด้านห่อหุ้มตัว มักพบการทำลายในสภาพนาข้าว
ที่อยู่ในที่ร่ม หรือข้าวที่ใบหนาแน่นมาก



ลักษณะการทำลาย

การป้องกันและกำจัด

1. กำจัดพืชอาศัย เช่น หญ้าข้าวนก หญ้าปล้อง หญ้าชันอากาศ และข้าวป่า
2. เมื่อเริ่มมีการระบาดไม่ควรใช้ปุ๋ยยูเรียเกิน 10 กิโลกรัม ต่อไร่
3. พ่นเชื้อราบีวเวอเรีย เพื่อกำจัดหนอน อัตรา 1 กิโลกรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นในช่วงเย็น
4. พ่นสารฟิโปรนิล เบนซัลเทป อัตราตามคำแนะนำในฉลาก ไม่ควรใช้สารกำจัดแมลง
ชนิดเม็ดและสารกลุ่มไพรีทรอยด์สังเคราะห์ในข้าวอายุหลังหว่าน 40 วัน เพราะ
จะทำลายศัตรูธรรมชาติ ทำให้เกิดการระบาดรุนแรงในระยะข้าวตั้งท้อง-ออกรวง



ตัวเต็มวัยหนอนห่อใบข้าว



หนอนห่อใบข้าว

