

คำแนะนำการใช้ปุ๋ย เอ็น พี เค สำหรับมันสำปะหลัง

แบบ	ค่าวิเคราะห์ดิน			คำแนะนำการใช้ปุ๋ย (กก./ไร่)		
	เอ็น (N)	พี (P)	เค (K)	46-0-0	18-46-0	0-0-60
1	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	28	18	27
2	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	28	18	20
3	ต่ำ	ต่ำ	สูง	28	18	7
4	ต่ำ	ปานกลาง	ต่ำ	32	9	27
5	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	32	9	20
6	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	32	9	7
7	ต่ำ	สูง	ต่ำ	35	0	27
8	ต่ำ	สูง	ปานกลาง	35	0	20
9	ต่ำ	สูง	สูง	35	0	7
10	ปานกลาง	ต่ำ	ต่ำ	11	18	27
11	ปานกลาง	ต่ำ	ปานกลาง	11	18	20
12	ปานกลาง	ต่ำ	สูง	11	18	7
13	ปานกลาง	ปานกลาง	ต่ำ	14	9	27
14	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง	14	9	20
15	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง	14	9	7
16	ปานกลาง	สูง	ต่ำ	18	0	27
17	ปานกลาง	สูง	ปานกลาง	18	0	20
18	ปานกลาง	สูง	สูง	18	0	7

หมายเหตุ ใส่ปุ๋ยครั้งเดียวหลังปลูก 1-3 เดือน หรือหลังการกำจัดวัชพืชครั้งแรก โดยใส่สองข้างของต้นมันสำปะหลังเมื่อดินมีความชื้นเหมาะสมแล้วต้องกลบปุ๋ยด้วย

คำแนะนำการใช้ปุ๋ย เอ็น พี เค สำหรับอ้อย (อ้อยปลูก)

แบบ	ค่าวิเคราะห์ดิน			คำแนะนำการใช้ปุ๋ย (กก./ไร่)			
				ครั้งที่ 1			ครั้งที่ 2
	เอ็น (N)	พี (P)	เค (K)	46-0-0	18-46-0	0-0-60	46-0-0
1	ต่ำ	ต่ำ-ปานกลาง	ต่ำ-ปานกลาง	8	13	20	14
2	ต่ำ	ต่ำ-ปานกลาง	สูง	8	13	10	14
3	ต่ำ	สูง	ต่ำ-ปานกลาง	11	7	20	14
4	ต่ำ	สูง	สูง	11	7	10	14
5	ปานกลาง	ต่ำ-ปานกลาง	ต่ำ-ปานกลาง	2	13	20	7
6	ปานกลาง	ต่ำ-ปานกลาง	สูง	2	13	10	7
7	ปานกลาง	สูง	ต่ำ-ปานกลาง	4	7	20	7
8	ปานกลาง	สูง	สูง	4	7	10	7

หมายเหตุ 1. **เขตชลประทาน** ใส่ปุ๋ยครั้งที่ 1 เมื่ออ้อยอายุ 1 เดือนหลังออก ส่วนครั้งที่ 2 ใส่ปุ๋ยเมื่ออ้อยอายุ 3 เดือน

2. **เขตอาศัยน้ำฝน** ครั้งที่ 1 ใส่ปุ๋ย 18-46-0 รอกันรอก 7 กก./ไร่ ครั้งที่ 2 ใส่ต้นฤดูฝน โดยใส่ปุ๋ยส่วนที่เหลือ คือ ให้เอาคำแนะนำการใช้ปุ๋ย ครั้งที่ 1 ในตารางลบด้วยปุ๋ย 18-46-0 ที่ใช้รอกันรอก 7 กก./ไร่ ซึ่งได้ใส่ไปแล้ว และครั้งที่ 3 ใส่หลังจากใส่ปุ๋ยครั้งที่สอง 2 เดือน โดยใช้ปุ๋ย 46-0-0 เท่ากับคำแนะนำการใช้ปุ๋ย ครั้งที่ 2 ในตาราง ตัวอย่างเช่น ถ้าค่าวิเคราะห์ เอ็น-พี-เค ได้ ปานกลาง-สูง-สูง ครั้งที่ 1 ให้ใส่ปุ๋ย 18-46-0 7 กก./ไร่ (รอกันรอก) ครั้งที่ 2 ให้ใส่ปุ๋ย 46-0-0 4 กก./ไร่+ปุ๋ย 0-0-60 10 กก./ไร่ (ไม่ใส่ปุ๋ย 18-46-0 เพราะใส่รอกันไปแล้ว)และครั้งที่ 3 ให้ใส่ปุ๋ย 46-0-0 7 กก./ไร่

3. **การใส่ปุ๋ยอ้อยก่อนใช้ทำท่อนพันธุ์** ให้ใส่ปุ๋ย 46-0-0 9 กก./ไร่ เมื่ออ้อยมีอายุ 7-8 เดือน หลังจากนั้น 1 เดือนตัดไปใช้เป็นท่อนพันธุ์ได้

คำแนะนำการใช้ปุ๋ย เอ็น พี เค สำหรับอ้อย (อ้อยตอ)

แบบ	ค่าวิเคราะห์ดิน			คำแนะนำการใช้ปุ๋ย (กก./ไร่)			
				ครั้งที่ 1			ครั้งที่ 2
	เอ็น (N)	พี (P)	เค (K)	46-0-0	18-46-0	0-0-60	46-0-0
1	ต่ำ	ต่ำ-ปานกลาง	ต่ำ-ปานกลาง	12	20	30	20
2	ต่ำ	ต่ำ-ปานกลาง	สูง	12	20	20	20
3	ต่ำ	สูง	ต่ำ-ปานกลาง	15	13	30	20
4	ต่ำ	สูง	สูง	15	13	20	20
5	ปานกลาง	ต่ำ-ปานกลาง	ต่ำ-ปานกลาง	6	20	30	13
6	ปานกลาง	ต่ำ-ปานกลาง	สูง	6	20	20	13
7	ปานกลาง	สูง	ต่ำ-ปานกลาง	8	13	30	13
8	ปานกลาง	สูง	สูง	8	13	20	13

- หมายเหตุ
1. เขตชลประทาน ใส่ปุ๋ยครั้งที่ 1 เมื่ออ้อยอายุ 1 เดือนหลังออก ส่วนครั้งที่ 2 ใส่เมื่ออ้อยอายุ 3 เดือน
 2. เขตอาศัยน้ำฝนใส่ปุ๋ยครั้งที่ 1 ต้นฤดูฝน ส่วนครั้งที่ 2 ใส่หลังจากใส่ปุ๋ยครั้งแรก 2 เดือน

คำแนะนำการใช้ปุ๋ย เอ็น-พี-เค สำหรับสับปะรด

แบบ	ค่าวิเคราะห์ดิน			คำแนะนำการใช้ปุ๋ย (กก./ไร่)			
				ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2		
	เอ็น (N)	พี (P)	เค (K)	21-0-0	21-0-0	18-46-0	0-0-60
1	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	175	100	74	220
2	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	175	100	74	110
3	ต่ำ	ต่ำ	สูง	175	100	74	55
4	ต่ำ	ปานกลาง	ต่ำ	175	150	37	220
5	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	175	150	37	110
6	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	175	150	37	55
7	ต่ำ	สูง	ต่ำ	175	175	0	220
8	ต่ำ	สูง	ปานกลาง	175	175	0	110
9	ต่ำ	สูง	สูง	175	175	0	55
10	ปานกลาง	ต่ำ	ต่ำ	120	60	74	220
11	ปานกลาง	ต่ำ	ปานกลาง	120	60	74	110
12	ปานกลาง	ต่ำ	สูง	120	60	74	55
13	ปานกลาง	ปานกลาง	ต่ำ	120	90	37	220
14	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง	120	90	37	110
15	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง	120	90	37	55
16	ปานกลาง	สูง	ต่ำ	120	120	0	220
17	ปานกลาง	สูง	ปานกลาง	120	120	0	110
18	ปานกลาง	สูง	สูง	120	120	0	55

- หมายเหตุ
1. ควรใส่ปุ๋ยบริเวณกาบใบล่าง
 2. ใส่ปุ๋ยครั้งที่ 1 เมื่อหน่อสับปะรดเริ่มมีรากใหม่ และครั้งที่ 2 หลังจากใส่ปุ๋ยครั้งแรก 3 เดือน

คำแนะนำการใช้ปุ๋ย เอ็น-พี-เค สำหรับพืชแก้วเศรษฐกิจ (แก้วเขียว แก้วเหลือง แก้วสีอง)

แบบ	ค่าวิเคราะห์ดิน			คำแนะนำการใช้ปุ๋ย (กก./ไร่)			
				ครั้งที่ 1			ครั้งที่ 2
	เอ็น (N)	พี (P)	เค (K)	46-0-0	18-46-0	0-0-60	46-0-0
1	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	2	20	10	10
2	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	2	20	5	10
3	ต่ำ	ต่ำ	สูง	2	20	0	10
4	ต่ำ	ปานกลาง	ต่ำ	5	13	10	10
5	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	5	13	5	10
6	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	5	13	0	10
7	ต่ำ	สูง	ต่ำ	8	7	10	10
8	ต่ำ	สูง	ปานกลาง	8	7	5	10
9	ต่ำ	สูง	สูง	8	7	0	10
10	ปานกลาง	ต่ำ	ต่ำ	0	20	10	7
11	ปานกลาง	ต่ำ	ปานกลาง	0	20	5	7
12	ปานกลาง	ต่ำ	สูง	0	20	0	7
13	ปานกลาง	ปานกลาง	ต่ำ	2	13	10	7
14	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง	2	13	5	7
15	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง	2	13	0	7
16	ปานกลาง	สูง	ต่ำ	4	7	10	7
17	ปานกลาง	สูง	ปานกลาง	4	7	5	7
18	ปานกลาง	สูง	สูง	4	7	0	7

- หมายเหตุ
1. ใส่ปุ๋ยครั้งที่ 1 โรยกันร่องพร้อมปลูก หรือข้างแถวปลูก แล้วพรวนกลบ
 2. ใส่ปุ๋ยครั้งที่ 2 เมื่อต้นแก้วเหลืองและแก้วสีองอายุ 30 วัน หรือต้นแก้วเขียวอายุ 20 วัน

คำแนะนำการใช้ปุ๋ย เอ็น-พี-เค สำหรับคະນ້າ พักภาคห้ว

กะหล่ำปลี กะหล่ำดอก บร็อกโคลี พักภาคขาวปลี และพืชผักที่ปลูกเพื่อรับประทานต้นและใบ

แบบ	ค่าวิเคราะห์ดิน			คำแนะนำการใช้ปุ๋ย (กก./ไร่)			
				ครั้งที่ 1			ครั้งที่ 2
	เอ็น (N)	พี (P)	เค (K)	46-0-0	18-46-0	0-0-60	46-0-0
1	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	14	22	25	22
2	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	14	22	17	22
3	ต่ำ	ต่ำ	สูง	14	22	9	22
4	ต่ำ	ปานกลาง-สูง	ต่ำ	18	11	25	22
5	ต่ำ	ปานกลาง-สูง	ปานกลาง	18	11	17	22
6	ต่ำ	ปานกลาง-สูง	สูง	18	11	9	22
7	ปานกลาง	ต่ำ	ต่ำ	15	22	25	17
8	ปานกลาง	ต่ำ	ปานกลาง	15	22	17	17
9	ปานกลาง	ต่ำ	สูง	15	22	9	17
10	ปานกลาง	ปานกลาง-สูง	ต่ำ	12	11	25	17
11	ปานกลาง	ปานกลาง-สูง	ปานกลาง	12	11	17	17
12	ปานกลาง	ปานกลาง-สูง	สูง	12	11	9	17

หมายเหตุ 1. ปลูกโดยใช้เมล็ดหวาน ครั้งที่ 1 ใส่ปุ๋ยหลังจากแตกใบแล้ว 3-4 ใบ ครั้งที่ 2 ใส่ปุ๋ยหลังจากครั้งแรกประมาณ 15 วัน

2. ปลูกด้วยต้นกล้า ครั้งที่ 1 ใส่ปุ๋ยหลังจากย้ายกล้า 7 วัน หรือเมื่อต้นกล้าตั้งตัวดีแล้ว ครั้งที่ 2 ใส่ปุ๋ยหลังจากย้ายกล้าแล้ว 30 วัน โดยโรยสองข้างแถวปลูก แล้วพรวนดินกลบ และให้น้ำทันที

คำแนะนำการใช้ปุ๋ย เอ็น-พี-เค สำหรับหน่อไม้ฝรั่ง

แบบ	ค่าวิเคราะห์ดิน			คำแนะนำการใช้ปุ๋ย (กก./ไร่)			
				ครั้งที่ 1			ครั้งที่ 2
	เอ็น (N)	พี (P)	เค (K)	46-0-0	18-46-0	0-0-60	46-0-0
1	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	16	26	40	26
2	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	16	26	27	26
3	ต่ำ	ต่ำ	สูง	16	26	10	26
4	ต่ำ	ปานกลาง-สูง	ต่ำ	21	13	40	20
5	ต่ำ	ปานกลาง-สูง	ปานกลาง	21	13	27	20
6	ต่ำ	ปานกลาง-สูง	สูง	21	13	10	20
7	ปานกลาง	ต่ำ	ต่ำ	10	26	40	26
8	ปานกลาง	ต่ำ	ปานกลาง	10	26	27	26
9	ปานกลาง	ต่ำ	สูง	10	26	10	26
10	ปานกลาง	ปานกลาง-สูง	ต่ำ	15	13	40	20
11	ปานกลาง	ปานกลาง-สูง	ปานกลาง	15	13	27	20
12	ปานกลาง	ปานกลาง-สูง	สูง	15	13	10	20

หมายเหตุ 1. **ระยะต้นกล้า** ครั้งที่ 1 ใส่ปุ๋ยหลังจากย้ายกล้า 7-10 วัน ครั้งที่ 2 ใส่ปุ๋ยหลังจากปลูก 30 วัน โดยโรยสองแถวข้างปลูกแล้วพรวนดินกลบ และให้น้ำทันที

2. **ระยะพักต้น** หลังตัดต้นแม่แล้วใส่ปุ๋ย 46-0-0 26 กก./ไร่ และใส่อีกครั้งหนึ่งในปริมาณเท่ากัน (ปุ๋ย 46-0-0 26 กก./ไร่) หลังจากใส่ปุ๋ยครั้งแรก 30 วัน

คำแนะนำการใช้ปุ๋ย เอ็น-พี-เค สำหรับพริก มะเขือ มะเขือเทศ และกระเจี๊ยบเขียว

แบบ	ค่าวิเคราะห์ดิน			คำแนะนำการใช้ปุ๋ย (กก./ไร่)			
				ครั้งที่ 1			ครั้งที่ 2
	เอ็น (N)	พี (P)	เค (K)	46-0-0	18-46-0	0-0-60	46-0-0
1	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	13	35	27	26
2	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	13	35	20	26
3	ต่ำ	ต่ำ	สูง	13	35	10	26
4	ต่ำ	ปานกลาง	ต่ำ	19	18	27	26
5	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	19	18	20	26
6	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	19	18	10	26
7	ต่ำ	สูง	ต่ำ	23	9	27	26
8	ต่ำ	สูง	ปานกลาง	23	9	20	26
9	ต่ำ	สูง	สูง	23	9	10	26
10	ปานกลาง	ต่ำ	ต่ำ	6	35	27	20
11	ปานกลาง	ต่ำ	ปานกลาง	6	35	20	20
12	ปานกลาง	ต่ำ	สูง	6	35	10	20
13	ปานกลาง	ปานกลาง	ต่ำ	13	18	27	20
14	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง	13	18	20	20
15	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง	13	18	10	20
16	ปานกลาง	สูง	ต่ำ	16	9	27	20
17	ปานกลาง	สูง	ปานกลาง	16	9	20	20
18	ปานกลาง	สูง	สูง	16	9	10	20

- หมายเหตุ
- ครั้งที่ 1 ใส่ปุ๋ยหลังจากย้ายกล้า 7 วัน หรือเมื่อต้นกล้าตั้งตัวดีแล้ว
 - ครั้งที่ 2 ใส่ปุ๋ยหลังจากย้ายกล้าแล้ว 30 วัน โดยโรยสองข้างแถวปลูกแล้วพรวนดินกลับและให้น้ำทันที

คำแนะนำการใช้ปุ๋ย เอ็น-พี-เค สำหรับกระเทียม หอมแดง หอมหัวใหญ่

แบบ	ค่าวิเคราะห์ดิน			คำแนะนำการใช้ปุ๋ย (กก./ไร่)			
				ครั้งที่ 1			ครั้งที่ 2
	เอ็น (N)	พี (P)	เค (K)	46-0-0	18-46-0	0-0-60	46-0-0
1	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	4	33	17	33
2	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง-สูง	4	33	9	33
3	ต่ำ	ปานกลาง	ต่ำ	8	22	17	33
4	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง-สูง	8	22	9	33
5	ต่ำ	สูง	ต่ำ	12	11	17	33
6	ต่ำ	สูง	ปานกลาง-สูง	12	11	9	33
7	ปานกลาง	ต่ำ	ต่ำ	0	33	17	22
8	ปานกลาง	ต่ำ	ปานกลาง-สูง	0	33	9	22
9	ปานกลาง	ปานกลาง	ต่ำ	3	22	17	22
10	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง-สูง	3	22	9	22
11	ปานกลาง	สูง	ต่ำ	7	11	17	22
12	ปานกลาง	สูง	ปานกลาง-สูง	7	11	9	22

- หมายเหตุ
- ครั้งที่ 1 หวานปุ๋ยให้ทั่วแปลงก่อนปลูก หลังจากปลูกแล้ว คลุมแปลงด้วยฟางข้าว แล้วรดน้ำให้ชุ่ม
 - ครั้งที่ 2 ใส่ปุ๋ยหลังจากปลูก 30 วัน โดยหวานให้ทั่วแปลง รดน้ำให้ชุ่ม อย่าให้ปุ๋ยตกค้างบนฟางข้าว

คำแนะนำการใช้ปุ๋ย เอ็น-พี-เค สำหรับมันฝรั่ง มันเทศ และเผือก

แบบ	ค่าวิเคราะห์ดิน			คำแนะนำการใช้ปุ๋ย (กก./ไร่)			
				ครั้งที่ 1			ครั้งที่ 2
	เอ็น (N)	พี (P)	เค (K)	46-0-0	18-46-0	0-0-60	46-0-0
1	ต่ำ	ต่ำ-ปานกลาง	ต่ำ	19	18	40	26
2	ต่ำ	ต่ำ-ปานกลาง	ปานกลาง	19	18	27	26
3	ต่ำ	ต่ำ-ปานกลาง	สูง	19	18	10	26
4	ต่ำ	สูง	ต่ำ	21	13	40	26
5	ต่ำ	สูง	ปานกลาง	21	13	27	26
6	ต่ำ	สูง	สูง	21	13	10	26
7	ปานกลาง	ต่ำ-ปานกลาง	ต่ำ	11	18	40	18
8	ปานกลาง	ต่ำ-ปานกลาง	ปานกลาง	11	18	27	18
9	ปานกลาง	ต่ำ-ปานกลาง	สูง	11	18	10	18
10	ปานกลาง	สูง	ต่ำ	13	13	40	18
11	ปานกลาง	สูง	ปานกลาง	13	13	27	18
12	ปานกลาง	สูง	สูง	13	13	10	18

- หมายเหตุ
- ครั้งที่ 1 ใส่ปุ๋ยรองก้นหลุมก่อนปลูก
 - ครั้งที่ 2 ใส่ปุ๋ยหลังจากปลูก 30 วัน โดยโรยสองข้างแถวปลูกแล้วพรวนดินกลบพร้อมกับพูนโคน และให้น้ำทันที

คำแนะนำการใช้ปุ๋ย เอ็น พี เค สำหรับมะพร้าว (ขนาดทรงพุ่ม 5 เมตร)

แบบ	ค่าวิเคราะห์ดิน			คำแนะนำการใช้ปุ๋ย (กรัม/ต้น/ปี)		
	เอ็น (N)	พี (P)	เค (K)	46-0-0	18-46-0	0-0-60
1	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	2,200	1,100	1,700
2	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	2,200	1,100	800
3	ต่ำ	ต่ำ	สูง	2,200	1,100	400
4	ต่ำ	ปานกลาง	ต่ำ	2,400	500	1,700
5	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	2,400	500	800
6	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	2,400	500	400
7	ต่ำ	สูง	ต่ำ	2,500	300	1,700
8	ต่ำ	สูง	ปานกลาง	2,500	300	800
9	ต่ำ	สูง	สูง	2,500	300	400
10	ปานกลาง	ต่ำ	ต่ำ	900	1,100	1,700
11	ปานกลาง	ต่ำ	ปานกลาง	900	1,100	800
12	ปานกลาง	ต่ำ	สูง	900	1,100	400
13	ปานกลาง	ปานกลาง	ต่ำ	1,100	500	1,700
14	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง	1,100	500	800
15	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง	1,100	500	400
16	ปานกลาง	สูง	ต่ำ	1,200	300	1,700
17	ปานกลาง	สูง	ปานกลาง	1,200	300	800
18	ปานกลาง	สูง	สูง	1,200	300	400

- หมายเหตุ
1. แบ่งปุ๋ยออกเป็น 2 ส่วน ใส่ปุ๋ยครั้งที่ 1 ช่วงต้นฤดูฝน และครั้งที่ 2 ช่วงปลายฤดูฝน
 2. หลังจากการใส่ปุ๋ย ควรไถหรือสับกลบปุ๋ยลงดิน

คำแนะนำการใช้ปุ๋ย เอ็น พี เค สำหรับมะม่วง (ขนาดทรงพุ่ม 5 เมตร)

แบบ	ค่าวิเคราะห์ดิน			คำแนะนำการใช้ปุ๋ย (กรัม/ต้น/ปี)		
	เอ็น (N)	พี (P)	เค (K)	46-0-0	18-46-0	0-0-60
1	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	2,300	900	1,800
2	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	2,300	900	900
3	ต่ำ	ต่ำ	สูง	2,300	900	500
4	ต่ำ	ปานกลาง	ต่ำ	2,400	500	1,800
5	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	2,400	500	900
6	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	2,400	500	500
7	ต่ำ	สูง	ต่ำ	2,500	200	1,800
8	ต่ำ	สูง	ปานกลาง	2,500	200	900
9	ต่ำ	สูง	สูง	2,500	200	500
10	ปานกลาง	ต่ำ	ต่ำ	1,000	900	1,800
11	ปานกลาง	ต่ำ	ปานกลาง	1,000	900	900
12	ปานกลาง	ต่ำ	สูง	1,000	900	500
13	ปานกลาง	ปานกลาง	ต่ำ	1,100	500	1,800
14	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง	1,100	500	900
15	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง	1,100	500	500
16	ปานกลาง	สูง	ต่ำ	1,200	200	1,800
17	ปานกลาง	สูง	ปานกลาง	1,200	200	900
18	ปานกลาง	สูง	สูง	1,200	200	500

- หมายเหตุ
1. ระยะที่ยังไม่ให้ผลผลิต (อายุ 1-3 ปี)
 2. ระยะที่ให้ผลผลิตแล้ว ให้ใส่ปุ๋ยบำรุงต้น (หลังจากตัดแต่งกิ่งหลังการเก็บเกี่ยว) ระยะสร้างตาดอก (ก่อนออกดอก 1-2 เดือน) ระยะบำรุงผล (หลังจากดอกบาน 1 เดือน) และระยะปรับปรุงคุณภาพ (ก่อนเก็บเกี่ยว 2 เดือน)

คำแนะนำการใช้ปุ๋ย เอ็น พี เค สำหรับทุเรียน (ขนาดทรงพุ่ม 8 เมตร)

แบบ	ค่าวิเคราะห์ดิน			คำแนะนำการใช้ปุ๋ย (กรัม/ต้น/ปี)		
	เอ็น (N)	พี (P)	เค (K)	46-0-0	18-46-0	0-0-60
1	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	3,500	1,800	2,700
2	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	3,500	1,800	1,400
3	ต่ำ	ต่ำ	สูง	3,500	1,800	700
4	ต่ำ	ปานกลาง	ต่ำ	3,800	900	2,700
5	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	3,800	900	1,400
6	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	3,800	900	700
7	ต่ำ	สูง	ต่ำ	4,000	500	2,700
8	ต่ำ	สูง	ปานกลาง	4,000	500	1,400
9	ต่ำ	สูง	สูง	4,000	500	700
10	ปานกลาง	ต่ำ	ต่ำ	1,400	1,800	2,700
11	ปานกลาง	ต่ำ	ปานกลาง	1,400	1,800	1,400
12	ปานกลาง	ต่ำ	สูง	1,400	1,800	700
13	ปานกลาง	ปานกลาง	ต่ำ	1,700	900	2,700
14	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง	1,700	900	1,400
15	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง	1,700	900	700
16	ปานกลาง	สูง	ต่ำ	1,900	500	2,700
17	ปานกลาง	สูง	ปานกลาง	1,900	500	1,400
18	ปานกลาง	สูง	สูง	1,900	500	700

- หมายเหตุ
1. ระยะที่ยังไม่ให้ผลผลิต (อายุ 1-4 ปี)
 2. ระยะที่ให้ผลผลิตแล้ว ให้ใส่ปุ๋ยบำรุงต้น (หลังจากตัดแต่งกิ่งหลังการเก็บเกี่ยว) ระยะสร้างตาดอก (ก่อนออกดอก 1-2 เดือน) ระยะบำรุงผล (หลังจากดอกบาน 1 เดือน) และระยะปรับปรุงคุณภาพ (ก่อนเก็บเกี่ยว 2 เดือน)

คำแนะนำการใช้ปุ๋ย เอ็น พี เค สำหรับมังคุด (ขนาดทรงพุ่ม 7 เมตร)

แบบ	ค่าวิเคราะห์ดิน			คำแนะนำการใช้ปุ๋ย (กรัม/ต้น/ปี)		
	เอ็น (N)	พี (P)	เค (K)	46-0-0	18-46-0	0-0-60
1	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	2,400	1,600	2,800
2	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	2,400	1,600	1,400
3	ต่ำ	ต่ำ	สูง	2,400	1,600	700
4	ต่ำ	ปานกลาง	ต่ำ	2,700	800	2,800
5	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	2,700	800	1,400
6	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	2,700	800	700
7	ต่ำ	สูง	ต่ำ	2,900	400	2,800
8	ต่ำ	สูง	ปานกลาง	2,900	400	1,400
9	ต่ำ	สูง	สูง	2,900	400	700
10	ปานกลาง	ต่ำ	ต่ำ	900	1,600	2,800
11	ปานกลาง	ต่ำ	ปานกลาง	900	1,600	1,400
12	ปานกลาง	ต่ำ	สูง	900	1,600	700
13	ปานกลาง	ปานกลาง	ต่ำ	1,200	800	2,800
14	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง	1,200	800	1,400
15	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง	1,200	800	700
16	ปานกลาง	สูง	ต่ำ	1,400	400	2,800
17	ปานกลาง	สูง	ปานกลาง	1,400	400	1,400
18	ปานกลาง	สูง	สูง	1,400	400	700

- หมายเหตุ
1. ระยะที่ยังไม่ให้ผลผลิต (อายุ 1-5 ปี)
 2. ระยะที่ให้ผลผลิตแล้ว ให้ใส่ปุ๋ยบำรุงต้น (หลังจากตัดแต่งกิ่งหลังการเก็บเกี่ยว) ระยะสร้างตาดอก (ก่อนออกดอก 1-2 เดือน) ระยะบำรุงผล (หลังจากดอกบาน 1 เดือน) และระยะปรับปรุงคุณภาพ (ก่อนเก็บเกี่ยว 2 เดือน)

คำแนะนำการใช้ปุ๋ย เอ็น พี เค สำหรับเจาะ: (ขนาดทรงพุ่ม 7 เมตร)

แบบ	ค่าวิเคราะห์ดิน			คำแนะนำการใช้ปุ๋ย (กรัม/ต้น/ปี)		
	เอ็น (N)	พี (P)	เค (K)	46-0-0	18-46-0	0-0-60
1	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	1,400	1,200	1,400
2	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	1,400	1,200	700
3	ต่ำ	ต่ำ	สูง	1,400	1,200	400
4	ต่ำ	ปานกลาง	ต่ำ	1,600	600	1,400
5	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	1,600	600	700
6	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	1,600	600	400
7	ต่ำ	สูง	ต่ำ	1,700	300	1,400
8	ต่ำ	สูง	ปานกลาง	1,700	300	700
9	ต่ำ	สูง	สูง	1,700	300	400
10	ปานกลาง	ต่ำ	ต่ำ	1,000	1,200	1,400
11	ปานกลาง	ต่ำ	ปานกลาง	1,000	1,200	700
12	ปานกลาง	ต่ำ	สูง	1,000	1,200	400
13	ปานกลาง	ปานกลาง	ต่ำ	1,200	600	1,400
14	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง	1,200	600	700
15	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง	1,200	600	400
16	ปานกลาง	สูง	ต่ำ	1,400	300	1,400
17	ปานกลาง	สูง	ปานกลาง	1,400	300	700
18	ปานกลาง	สูง	สูง	1,400	300	400

- หมายเหตุ
1. ระยะที่ยังไม่ให้ผลผลิต (อายุ 1-4 ปี)
 2. ระยะที่ให้ผลผลิตแล้ว ให้ใส่ปุ๋ยบำรุงต้น (หลังจากตัดแต่งกิ่งหลังการเก็บเกี่ยว) ระยะสร้างตาดอก (ก่อนออกดอก 1-2 เดือน) ระยะบำรุงผล (หลังจากดอกบาน 1 เดือน) และระยะปรับปรุงคุณภาพ (ก่อนเก็บเกี่ยว 2 เดือน)

คำแนะนำการใช้ปุ๋ย เอ็น พี เค สำหรับส้ม (ขนาดทรงพุ่ม 4 เมตร)

แบบ	ค่าวิเคราะห์ดิน			คำแนะนำการใช้ปุ๋ย (กรัม/ต้น/ปี)		
	เอ็น (N)	พี (P)	เค (K)	46-0-0	18-46-0	0-0-60
1	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	1,300	1,100	1,100
2	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	1,300	1,100	600
3	ต่ำ	ต่ำ	สูง	1,300	1,100	300
4	ต่ำ	ปานกลาง	ต่ำ	1,500	600	1,100
5	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	1,500	600	600
6	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	1,500	600	300
7	ต่ำ	สูง	ต่ำ	1,700	300	1,100
8	ต่ำ	สูง	ปานกลาง	1,700	300	600
9	ต่ำ	สูง	สูง	1,700	300	300
10	ปานกลาง	ต่ำ	ต่ำ	500	1,100	1,100
11	ปานกลาง	ต่ำ	ปานกลาง	500	1,100	600
12	ปานกลาง	ต่ำ	สูง	500	1,100	300
13	ปานกลาง	ปานกลาง	ต่ำ	700	600	1,100
14	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง	700	600	600
15	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง	700	600	300
16	ปานกลาง	สูง	ต่ำ	800	300	1,100
17	ปานกลาง	สูง	ปานกลาง	800	300	600
18	ปานกลาง	สูง	สูง	800	300	300

- หมายเหตุ
1. ระยะที่ยังไม่ให้ผลผลิต (อายุ 1-2 ปี)
 2. ระยะที่ให้ผลผลิตแล้ว ให้ใส่ปุ๋ยบำรุงต้น (หลังจากตัดแต่งกิ่งหลังการเก็บเกี่ยว) ระยะสร้างตาดอก (ก่อนออกดอก 1-2 เดือน) ระยะบำรุงผล (หลังจากดอกบาน 1 เดือน) และระยะปรับปรุงคุณภาพ (ก่อนเก็บเกี่ยว 2 เดือน)

คำแนะนำการใช้ปุ๋ย เอ็น พี เค สำหรับลำไย (ขนาดทรงพุ่ม 8 เมตร)

แบบ	ค่าวิเคราะห์ดิน			คำแนะนำการใช้ปุ๋ย (กรัม/ต้น/ปี)		
	เอ็น (N)	พี (P)	เค (K)	46-0-0	18-46-0	0-0-60
1	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	2,500	1,800	2,300
2	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	2,500	1,800	1,200
3	ต่ำ	ต่ำ	สูง	2,500	1,800	600
4	ต่ำ	ปานกลาง	ต่ำ	2,800	900	2,300
5	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	2,800	900	1,200
6	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	2,800	900	600
7	ต่ำ	สูง	ต่ำ	3,000	500	2,300
8	ต่ำ	สูง	ปานกลาง	3,000	500	1,200
9	ต่ำ	สูง	สูง	3,000	500	600
10	ปานกลาง	ต่ำ	ต่ำ	900	1,800	2,300
11	ปานกลาง	ต่ำ	ปานกลาง	900	1,800	1,200
12	ปานกลาง	ต่ำ	สูง	900	1,800	600
13	ปานกลาง	ปานกลาง	ต่ำ	1,200	900	2,300
14	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง	1,200	900	1,200
15	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง	1,200	900	600
16	ปานกลาง	สูง	ต่ำ	1,400	500	2,300
17	ปานกลาง	สูง	ปานกลาง	1,400	500	1,200
18	ปานกลาง	สูง	สูง	1,400	500	600

หมายเหตุ ระยะที่ให้ผลผลิตแล้ว แบ่งปุ๋ยเป็น 2 ส่วน ใส่ปุ๋ยครั้งที่ 1 หลังการตัดแต่งกิ่ง (หลังการเก็บเกี่ยว) และครั้งที่ 2 เมื่อติดผลอ่อน

คำแนะนำการใช้ปุ๋ย เอ็น พี เค สำหรับลิ้นจี่ (ขนาดทรงพุ่ม 6 เมตร)

แบบ	ค่าวิเคราะห์ดิน			คำแนะนำการใช้ปุ๋ย (กรัม/ต้น/ปี)		
	เอ็น (N)	พี (P)	เค (K)	46-0-0	18-46-0	0-0-60
1	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	2,000	1,200	1,900
2	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	2,000	1,200	1,000
3	ต่ำ	ต่ำ	สูง	2,000	1,200	500
4	ต่ำ	ปานกลาง	ต่ำ	2,200	600	1,900
5	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	2,200	600	1,000
6	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	2,200	600	500
7	ต่ำ	สูง	ต่ำ	2,300	300	1,900
8	ต่ำ	สูง	ปานกลาง	2,300	300	1,000
9	ต่ำ	สูง	สูง	2,300	300	500
10	ปานกลาง	ต่ำ	ต่ำ	800	1,200	1,900
11	ปานกลาง	ต่ำ	ปานกลาง	800	1,200	1,000
12	ปานกลาง	ต่ำ	สูง	800	1,200	500
13	ปานกลาง	ปานกลาง	ต่ำ	1,000	600	1,900
14	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง	1,000	600	1,000
15	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง	1,000	600	500
16	ปานกลาง	สูง	ต่ำ	1,100	300	1,900
17	ปานกลาง	สูง	ปานกลาง	1,100	300	1,000
18	ปานกลาง	สูง	สูง	1,100	300	500

- หมายเหตุ
1. ระยะที่ยังไม่ให้ผลผลิต (อายุ 1-4 ปี)
 2. ระยะที่ให้ผลผลิตแล้ว ให้ใส่ปุ๋ยบำรุงต้น (หลังจากตัดแต่งกิ่งหลังการเก็บเกี่ยว) ระยะสร้างตาดอก (ก่อนออกดอก 1-2 เดือน) ระยะบำรุงผล (หลังจากดอกบาน 1 เดือน) และระยะปรับปรุงคุณภาพ (ก่อนเก็บเกี่ยว 2 เดือน)

คำแนะนำการใช้ปุ๋ย เอ็น พี เค สำหรับยางพาราหลังเปิดกรีด

แบบ	ค่าวิเคราะห์ดิน			คำแนะนำการใช้ปุ๋ย (กรัม/ต้น/ปี)		
	เอ็น (N)	พี (P)	เค (K)	46-0-0	18-46-0	0-0-60
1	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	580	220	400
2	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง-สูง	580	220	300
3	ต่ำ	ปานกลาง-สูง	ต่ำ	610	110	400
4	ต่ำ	ปานกลาง-สูง	ปานกลาง-สูง	610	110	300
5	ปานกลาง	ต่ำ	ต่ำ	400	220	400
6	ปานกลาง	ต่ำ	ปานกลาง-สูง	400	220	300
7	ปานกลาง	ปานกลาง-สูง	ต่ำ	450	110	400
8	ปานกลาง	ปานกลาง-สูง	ปานกลาง-สูง	450	110	300

- หมายเหตุ**
1. ปลุกยางไร่ละ 80 ต้น
 2. ใส่ปุ๋ย 2 ครั้ง/ปี ไร่เป็นแถวระหว่างแถวยาง สำหรับในพื้นที่ลาดเท ให้ขุดหลุมลึก 10 ซม. แล้วจึงใส่ปุ๋ยเพื่อลดการชะล้างปุ๋ยออกจากพื้นที่

คำแนะนำการใช้ปุ๋ย เอ็น พี เค สำหรับปาล์มน้ำมัน (ขนาดทรงพุ่ม 7 เมตร)

แบบ	ค่าวิเคราะห์ดิน			คำแนะนำการใช้ปุ๋ย (กรัม/ต้น/ปี)		
	เอ็น (N)	พี (P)	เค (K)	46-0-0	18-46-0	0-0-60
1	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	2,300	2,000	2,400
2	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	2,300	2,000	1,200
3	ต่ำ	ต่ำ	สูง	2,300	2,000	600
4	ต่ำ	ปานกลาง	ต่ำ	2,600	1,000	2,400
5	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	2,600	1,000	1,200
6	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	2,600	1,000	600
7	ต่ำ	สูง	ต่ำ	2,900	500	2,400
8	ต่ำ	สูง	ปานกลาง	2,900	500	1,200
9	ต่ำ	สูง	สูง	2,900	500	600
10	ปานกลาง	ต่ำ	ต่ำ	800	2,000	2,400
11	ปานกลาง	ต่ำ	ปานกลาง	800	2,000	1,200
12	ปานกลาง	ต่ำ	สูง	800	2,000	600
13	ปานกลาง	ปานกลาง	ต่ำ	1,100	1,000	2,400
14	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง	1,100	1,000	1,200
15	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง	1,100	1,000	600
16	ปานกลาง	สูง	ต่ำ	1,400	500	2,400
17	ปานกลาง	สูง	ปานกลาง	1,400	500	1,200
18	ปานกลาง	สูง	สูง	1,400	500	600

- หมายเหตุ
1. แบ่งปุ๋ยออกเป็น 2 ส่วน ใส่ปุ๋ยครั้งที่ 1 ช่วงต้นฤดูฝน และครั้งที่ 2 ช่วงปลายฤดูฝน
 2. หลังจากการใส่ปุ๋ย ควรไถหรือสับกลบปุ๋ยลงดิน