



รายงานสถานการณ์ศัตรูไม้ผล  
วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓  
กลุ่มพยากรณ์และเตือนการระบาดของศัตรูพืช  
กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย  
โทร. ๐ ๒๙๕๕ ๑๕๑๔ โทรสาร ๐ ๒๙๕๕ ๑๕๑๔

E-mail: Bio53@hotmail.com, doae\_pmd@hotmail.com



## สถานการณ์การระบาดของศัตรูพืชที่สำคัญ

### ศัตรูไม้ผล

#### ๑. สถานการณ์การปลูกไม้ผล

- ๑.๑ พื้นที่ปลูกทุเรียนทั้งหมด ๗๐ จังหวัด รวมพื้นที่ยืนต้น ๘๗๗,๙๕๕ ไร่
- ๑.๒ พื้นที่ปลูกมังคุดทั้งหมด ๔๘ จังหวัด รวมพื้นที่ยืนต้น ๔๔๐,๐๙๓ ไร่
- ๑.๓ พื้นที่ปลูกเงาะทั้งหมด ๕๙ จังหวัด รวมพื้นที่ยืนต้น ๒๑๒,๒๐๗ ไร่
- ๑.๔ พื้นที่ปลูกลำไยทั้งหมด ๖๒ จังหวัด รวมพื้นที่ยืนต้น ๑,๒๑๖,๕๐๘ ไร่

#### ๒. สถานการณ์การระบาดของศัตรูไม้ผลที่สำคัญ

##### ๒.๑ ศัตรูทุเรียน

๒.๑.๑ หนอนเจาะผล พื้นที่ระบาด ๓ จังหวัด จำนวน ๒๔๐ ไร่ พื้นที่ระบาดเพิ่มขึ้น ๑๐๐.๒๕ ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา ๑๓๙.๗๕ ไร่)

๒.๑.๒ เพลี้ยแป้ง พื้นที่ระบาด ๖ จังหวัด จำนวน ๒๙๗ ไร่ พื้นที่ระบาดลดลง ๒๒ ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา ๓๑๙ ไร่)

๒.๑.๓ เพลี้ยไฟ พื้นที่ระบาด ๔ จังหวัด จำนวน ๘๐๐.๕๐ ไร่ พื้นที่ระบาดคงที่

๒.๑.๔ โรครากเน่าโคนเน่า พื้นที่ระบาด ๖ จังหวัด จำนวน ๔,๔๙๙ ไร่ พื้นที่ระบาดลดลง ๑๐๖ ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา ๔,๖๐๕ ไร่)

##### ๒.๒ ศัตรูมังคุด

๒.๒.๑ เพลี้ยแป้ง พื้นที่ระบาด ๒ จังหวัด จำนวน ๒๓๓ ไร่ พื้นที่ระบาดลดลง ๓ ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา ๒๓๖ ไร่)

๒.๒.๒ เพลี้ยไฟ พื้นที่ระบาด ๕ จังหวัด จำนวน ๓,๔๘๗.๒๕ ไร่ พื้นที่ระบาดคงที่

๒.๒.๓ โรคใบจุด พื้นที่ระบาด ๒ จังหวัด จำนวน ๑๕๕ ไร่ พื้นที่ระบาดเพิ่มขึ้น ๑๕๕ ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา ไม่พบการระบาด)

#### ๓. การดำเนินงานในพื้นที่ระบาด

##### ๓.๑ การควบคุมศัตรูทุเรียน

๓.๑.๑ โรครากเน่าโคนเน่าทุเรียน แจ้งเตือนให้เกษตรกรเฝ้าระวังการระบาดของโรครากเน่าโคนเน่าทุเรียนในพื้นที่และหมั่นสำรวจสวนทุเรียนอย่างสม่ำเสมอ แนะนำให้เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา ในการป้องกันกำจัดโรครากเน่าโคนเน่าทุเรียน

๓.๑.๒ **หนอนเจาะผลทุเรียน** สํารวจสวนทุเรียนอย่างสม่ำเสมอ เมื่อพบรอยทำลายของหนอนให้ใช้ไม้หรือลวดแข็งเขี่ยตัวหนอนออกมาทำลาย ผลทุเรียนที่เน่าและร่วงเพราะถูกหนอนทำลายควรเก็บมาเผาไฟหรือฝัง ตัดแต่งผลทุเรียนที่มีจำนวนมากเกินไปโดยเฉพาะผลที่อยู่ติดกันควรใช้กาบมะพร้าวหรือกิ่งไม้กั้นระหว่างผล เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเต็มวัยวางไข่หรือตัวหนอนเข้าทำลายหลอบอาศัย อนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติ เช่น แตนเบียน *Apanteles* sp. เมื่อจำเป็นต้องใช้สารเคมีกำจัดแมลง แนะนำให้ใช้สารเคมี ได้แก่ แลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน ๒.๕% อีซี อัตรา ๒๐ มิลลิลิตรต่อน้ำ ๒๐ ลิตร หรือ คลอร์ไพริฟอส ๔๐% อีซี อัตรา ๒๐ มิลลิลิตรต่อน้ำ ๒๐ ลิตร หรือ คาร์โบซัลแฟน ๒๐% อีซี อัตรา ๕๐ มิลลิลิตรต่อน้ำ ๒๐ ลิตร พ่นเฉพาะส่วนผลทุเรียนที่พบการทำลายของหนอนเจาะผล ในแหล่งที่มีการระบาด พ่นหลังจากทุเรียนติดผลแล้ว ๑ เดือน พ่น ๓ - ๔ ครั้ง ทุก ๒๐ วัน

๓.๑.๓ **เพลี้ยแป้ง** หากพบระบาดเพียงเล็กน้อยให้ตัดหรือเด็ดส่วนที่ถูกทำลายไปทิ้งนอกแปลง หากพบการระบาดบริเวณผลทุเรียนให้ใช้น้ำพ่นบริเวณที่ถูกทำลาย เพื่อให้เพลี้ยแป้งหลุดออกไป หรือใช้น้ำผสมไวท์ออยล์ อัตรา ๒๐ มิลลิลิตรต่อน้ำ ๒๐ ลิตร พ่นเพื่อกำจัด เนื่องจากเพลี้ยแป้งจะแพร่ระบาดโดยมีมดพาไป การป้องกันโดยใช้ผ้าชุบสารฆ่าแมลง เช่น มาลาไรออน (มาลาไรออน 83% อีซี) อัตรา ๒๐ มิลลิลิตร หรือคาร์บาริล (เซฟวิน 85% ดับบลิวพี) อัตรา ๑๐ กรัมต่อน้ำ ๒๐ ลิตร พ่นไว้ตามกิ่งสามารถป้องกันไม่ให้มดคาบเพลี้ยแป้งเคลื่อนย้ายไปยังส่วนต่างๆ ของต้นทุเรียน หรือการพ่นสารฆ่าแมลงไปที่โคนต้นจะช่วยป้องกันมดและลดการเข้าทำลายของเพลี้ยแป้งได้

๓.๑.๔ **เพลี้ยไฟ** หากพบเพลี้ยไฟจำนวนมากกว่าหรือเท่ากับ ๑ ตัวต่อ ๔ ดอก หรือ ๑ ตัวต่อยอด ให้พ่นด้วยสารฆ่าแมลงที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันกำจัด เช่น อิมิดาโคลพริด 70% ดับบลิวจี อัตรา ๓ กรัมต่อน้ำ ๒๐ ลิตร หรือ สารคาร์โบซัลแฟน 20% อีซี อัตรา ๕๐ มิลลิลิตรต่อน้ำ ๒๐ ลิตร หรือสารฟิโพรนิล 5% เอสซี อัตรา ๑๐ มิลลิลิตรต่อน้ำ ๒๐ ลิตร และไม่ควรรพ่นสารชนิดใดชนิดหนึ่งติดต่อกันหลายครั้ง เพราะจะทำให้เพลี้ยไฟสามารถต้านทานสารฆ่าแมลงได้

### ๓.๒ การควบคุมศัตรูมังคุด

๓.๒.๑ หมั่นสำรวจและสังเกตการเข้าทำลายของศัตรูพืช และดูแลสวนให้สะอาดอย่างสม่ำเสมอ

๓.๒.๒ หากพบการระบาดของเพลี้ยแป้ง และเพลี้ยไฟให้พ่นด้วยสารฆ่าแมลง เช่น อิมิดาโคลพริด 70% ดับบลิวจี อัตรา ๓ กรัมต่อน้ำ ๒๐ ลิตร หรือสารคาร์โบซัลแฟน 20% อีซี อัตรา ๕๐ มิลลิลิตรต่อน้ำ ๒๐ ลิตร หรือสารฟิโพรนิล 5% เอสซี อัตรา ๑๐ มิลลิลิตรต่อน้ำ ๒๐ ลิตร และไม่ควรรพ่นสารชนิดใดชนิดหนึ่งติดต่อกันหลายครั้ง เพราะจะทำให้เพลี้ยแป้ง และเพลี้ยไฟสามารถต้านทานสารฆ่าแมลงได้ และมักพบการระบาดของเพลี้ยแป้ง และเพลี้ยไฟในระยะที่มังคุดออกดอกถึงติดผลอ่อน อาจทำให้ดอกและผลอ่อนร่วง ผลที่ไม่ร่วงเมื่อมีการพัฒนาผลโตขึ้น จะเห็นรอยทำลายชัดเจน เนื่องจากผิวเปลือกมังคุดมีลักษณะขรุขระที่เรียกว่า ผิวขี้กลาก ทำให้ผลผลิตมีคุณภาพต่ำ

๓.๒.๓ หากพบการระบาดของโรคใบจุด ให้ตัดแต่งกิ่งหรือใบที่เป็นโรคนำออกไปทำลายนอกแปลง หากพบการระบาดรุนแรงให้ใช้สารป้องกันกำจัดโรคพืช เช่น คาร์เบนดาซิม ๕๐% ดับบลิวพี อัตรา ๑๐ - ๑๕ กรัมต่อน้ำ ๒๐ ลิตร หรือ กลุ่มโคนาโซล เช่น โพรพิโคนาโซล เฮกซะโคนาโซล ๒๐ ซีซี ต่อน้ำ ๒๐ ลิตร

### ๔.การคาดการณ์ศัตรูไม้ผล ในช่วงระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓

#### ภาคเหนือ

- ทุเรียน ระวัง หนอนเจาะลำต้น และโรครากเน่าโคนเน่า
- ลำไย ระวัง หนอนกินช่อดอก มวนลำไย และโรคพุ่มไม้กวาด

#### ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- ทุเรียน ระวัง หนอนเจาะผล หนอนกินใบ และโรครากเน่าโคนเน่า
- มังคุด ระวัง เพลี้ยไฟ ไรแดง และโรคใบจุด
- ลำไย ระวัง ผีเสื้อมวนหวาน มวนลำไย และโรคพุ่มไม้กวาด

**ภาคกลาง และภาคตะวันตก**

- ทูเรียน ระวัง หนอนเจาะลำต้น และโรครากเน่าโคนเน่า
- มังคุด ระวัง เพลี้ยไฟ และไรแดง
- เงาะ ระวัง หนอนกินใบ และเพลี้ยแป้ง


**ภาคตะวันออก**

- ทูเรียน ระวัง หนอนเจาะผล โรคมลเน่า และโรครากเน่าโคนเน่า
- มังคุด ระวัง หนอนซอนใบ เพลี้ยไฟ และไรแดง
- เงาะ ระวัง หนอนกินใบ และเพลี้ยแป้ง

**ภาคใต้**

- ทูเรียน ระวัง หนอนเจาะผล โรคมลเน่า และโรครากเน่าโคนเน่า
- มังคุด ระวัง หนอนกินใบ เพลี้ยไฟ และไรแดง
- เงาะ ระวัง หนอนกินช่อดอก และโรคใบจุดสาหร่าย

กราฟแสดงสถานการณ์การระบาดของศัตรูไม้ผล ปี ๒๕๖๓



- เพลี้ยไฟ - ทูเรียน ๘๐๐.๕๐ ไร่
- เพลี้ยแป้ง - ทูเรียน ๒๕๗ ไร่
- หนอนเจาะผล - ทูเรียน ๒๔๐ ไร่
- โรครากเน่าโคนเน่า - ทูเรียน ๔,๔๙๙ ไร่
- เพลี้ยแป้ง - มังคุด ๒๓๓ ไร่
- เพลี้ยไฟ - มังคุด ๓,๔๘๗.๒๕ ไร่